

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ปรณงค์ขอความร่วมมือประชาชนตำบลบางแค ให้มีความสำคัญกับ โรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นภัยทางสุขภาพอาจทำให้เสียชีวิตได้ ยุงลายเป็นพาหะนำโรค มักเกิดในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำท่วมขัง การป้องกันโรคไข้เลือดออก คือ การจัดสภาพแวดล้อมไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยง ได้แก่

1.บ้านเรือน/ชุมชน

2.ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

3.โรงพยาบาล/สถานพยาบาล

4.สถานที่ทำงาน/อาคารสาธารณะ

โดยมีแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันภัยร้ายโรคไข้เลือดออก

1.สื่อสารเตือนภัยไข้เลือดออกอย่างเร่งด่วนและประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

2.สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายไม่ให้มีน้ำขังในภาชนะวัสดุต่างๆ

3.กำจัด ลดสะสมขยะทำความสะอาดพื้นที่ให้สะอาดอยู่เสมอ

4.ติดตั้งมุ้งลวด หรือจัดให้มีมุ้งสำหรับเด็กและผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยและนอนพักผ่อนทุกครั้ง

5.ไม่ควรพ่นยากำจัดยุงภายในอาคารขณะมีคนอยู่อาศัยหากมีสัตว์พ่นรอบอาคาร หลีกเลี้ยงออกนอกอาคาร ปิดบ้านให้มิดชิด งดตากผ้าและสวมหน้ากากป้องกันทันที

6.หากจุดยากันยุงให้ทำในพื้นที่เปิดโล่ง ระบายอากาศดี หลีกเลี้ยงจุดยาในบ้านหรืออาคารปิดมิดชิด หรือที่อับอากาศ

7.สังเกตอาการตนเองและครอบครัว หากมีอาการผิดปกติหรือสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกให้แจ้งเจ้าหน้าที่พบแพทย์ทันที

ด้วยความปรารถนาดี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บางแค



ป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก



ไข้เลือดออก เป็นภัยทางสุขภาพอาจทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ ยุงลายเป็นพาหะนำโรคมักเกิดในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำท่วมขัง ทำให้ยุงลายสามารถวางไข่ได้ การป้องกันภัยไข้เลือดออกที่สำคัญ คือ การจัดสภาพแวดล้อมไม่ให้ยุงลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมถึงการสร้างเสริมพฤติกรรมอนามัยที่ดีให้กับประชาชน

พื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยง

 บ้านเรือน/ชุมชน
 ศูนย์เด็กเล็ก
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
โรงเรียน
 โรงพยาบาล/
สถานพยาบาล
 สถานที่ทำงาน/
อาคารสาธารณะ

แนวทางปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก



1. สื่อสารเตือนภัยไข้เลือดออกอย่างเร่งด่วน และประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด



2. สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ไม่ให้มีน้ำขังในภาชนะวัสดุต่าง ๆ



3. กำจัด ลดสะสมขยะ ทำความสะอาดพื้นที่ให้สะอาดอยู่เสมอ



4. ติดตั้งมุ้งลวด หรือจัดให้มีมุ้งสำหรับเด็กและผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยขณะนอนพักผ่อนทุกครั้ง



5. ไม่ควรพ่นยากำจัดยุงภายในบ้านหรือในอาคารขณะมีคนอยู่อาศัย หากมีฉีดพ่นรอบอาคาร หลีกเลี่ยงออกนอกอาคาร ปิดบ้านให้มิดชิด งดตากผ้า และสวมหน้ากากป้องกันกันที่



6. หากจุดยุงลายยังให้ทำในพื้นที่ที่ปิดโล่ง ระบายอากาศดี หลีกเลี่ยงจุดยุงลายในบ้านหรืออาคารปิดมิดชิด หรือที่อับอากาศ



7. สังเกตอาการตนเองและครอบครัว หากมีอาการผิดปกติหรือสงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกให้แจ้งเจ้าหน้าที่และพบแพทย์ทันที