

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

รณรงค์ให้ประชาชนตำบลบางแค ให้ความสำคัญกับ โรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกา เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกา ซึ่งอยู่ในตระกูลฟลาวีไวรัส มีอยู่หลายเป็นพาหะนำโรค โดยยุงที่เป็นพาหะนำโรคซิกาเป็นชนิดเดียวกันกับยุงที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลายและไข้เหลืองสาเหตุหลักของการติดเชื้อเกิดจากโดนยุงลายที่มีเชื้อเชื้อไวรัสซิกาและช่องทางอื่นๆ ที่อาจเป็นไปได้ เช่น การแพร่ผ่านทางเลือด การแพร่จากมารดาที่ป่วยสู่ทารกในครรภ์

การแพร่เชื้อของไวรัสซิกา สามารถแพร่เชื้อโดยยุงลายที่มีเชื้อแล้วไปกัดคน หลังจากได้รับเชื้อแล้ว เชื้อจะมีการฟักตัว 3-12 วัน

อาการของผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา ปวดศีรษะ เยื่อบุตาอักเสบ มีไข้ อ่อนเพลีย มีผื่นแดง ปวดกล้ามเนื้อ/ปวดข้อ

การรักษา ปัจจุบันยังไม่มียาป้องกันเฉพาะการรักษาจะทำการรักษาตามอาการ

แนวทางการป้องกัน

1.ป้องกันการถูกยุงกัด

-สวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวเพื่อปกคลุมโดยใช้เสื้อสีสว่างถ้าทำไม่ได้ควรทายากันยุงป้องกัน

-นอนกางมุ้ง ติดมุ้งลวดที่ประตู หน้าต่าง

-กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทั้งในบ้านและรอบบริเวณบ้านโดยทำความสะอาด การเทน้ำทิ้ง หรือครอบฝาที่สามารถบรรจุน้ำได้ เช่น

กระถางต้นไม้

เพื่อไม่ให้มันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

2.หากมีอาการไข้ ออกผื่น ตาแดง ปวดข้อ หรืออาการว่าอาจเป็นโรคนี้ โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ ควรรีบพบแพทย์และเข้ารับการรักษาทันที

ด้วยความปรารถนาดี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บางแค



โรคติดต่อเชื้อไวรัสชิคา

ยุงลายกับ

โรคติดต่อเชื้อไวรัสชิคา เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชิคา ซึ่งอยู่ในตระกูลฟลาวิไวรัส (flavivirus) มียุงลายเป็นพาหะนำโรค โดยยุงที่เป็นพาหะนำโรคใช้ชิคาเป็นชนิดเดียวกันกับยุงที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก โรคไข้วัดข้อของลาย (Chikungunya) และไข้เหลือง สาเหตุหลักของการติดเชื้อเกิดจากการโดนยุงลายที่มีเชื้อไวรัสชิคา และช่องทางอื่นๆ ที่อาจเป็นไปได้ เช่น การแพร่ผ่านทางเลือด การแพร่จากมารดาที่ป่วยสู่ทารกในครรภ์

การแพร่เชื้อของไวรัสชิคา

สามารถแพร่เชื้อโดยยุงลายที่มีเชื้อและไปกัดคน หลังจากได้รับเชื้อแล้วเชื้อจะมีระยะฟักตัว 3 - 12 วัน

อาการของผู้ติดเชื้อไวรัสชิคา

- ปวดศีรษะ
- เหนื่อยตาอักเสบ
- มีไข้อ่อนเพลีย
- มีผื่นแดง
- ปวดกล้ามเนื้อ/ปวดข้อ

การรักษา

ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันเฉพาะ การรักษาจะทำการรักษาตามอาการ

แนวทางการป้องกัน

- 1 ป้องกันการถูกยุงกัด
 - สวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวเพื่อปกคลุมโดยใช้เสื้อผ้าสีสว่าง ถ้าทำไม่ได้ควรทายากันยุงป้องกัน
 - นอนกางมุ้ง และติดมุ้งลวดที่ประตู หน้าต่าง
 - กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทั้งในบ้านและบริเวณโดยรอบ
- 2 หากมีอาการไข้ ออกผื่น ตาแดง ปวดข้อ หรืออาการว่าอาจเป็นโรคนี้ โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ ควรรีบพบแพทย์และเข้ารับการรักษาทันที

โรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกา

เขียนโดย กัญยา

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2023 เวลา 11:04 น.
